

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

CURVA DA CARICO ORALE DI GLUCOSIO (OGTT) (Dietro consenso informato)

Tempo di permanenza: almeno 3 ore

Modalità di esecuzione: Si esegue un prelievo basale per glicemia

Si verifica all'istante il dosaggio della glicemia mediante refllettometro tarato : per valore superiore o uguale a 126 mg **non si procede per la somministrazione del glucosio**, per valore inferiore a 126 mg si somministra al paziente una soluzione glucosata per os (75 g di glucosio). I prelievi vengono effettuati ad una distanza di tempo 30 – 60 -120 -180 -240 a discrezione del medico.

Durante l'esecuzione del test il paziente non deve assumere alimenti o bevande diversi dall'acqua, non deve fumare e deve rimanere possibilmente seduto.

Il paziente deve seguire una dieta bilanciata nella settimana precedente il prelievo.

CURVA DA CARICO ORALE DI GLUCOSIO IN PAZIENTI GRAVIDE

Tempo di permanenza: almeno 3 ore

Modalità di esecuzione: Si esegue un prelievo basale per glicemia

Si verifica all'istante il dosaggio della glicemia mediante refllettometro tarato : per valore superiore o uguale a 92 mg **non si procede per la somministrazione del glucosio**, per valore inferiore a 92 mg si somministra una soluzione glucosata (75 g di glucosio).

I prelievi vengono effettuati ad una distanza di tempo 30 – 60 -120 -180 -240 a discrezione del medico.

Durante l'esecuzione del test il paziente non deve assumere alimenti o bevande diversi dall'acqua, non deve fumare e deve rimanere possibilmente seduto. Per le donne in gravidanza, la quantità di glucosio da somministrare è a volte suggerita dal ginecologo.

Il Direttore Responsabile
Dott. Antonio Cavotta